

# ATENOLOL

## Tabletas BP 50 mg

(Tableta Recubierta con Película)

**Composición:***venta solo con receta*

Cada tableta recubierta con película contiene:  
 Atenolol BP ..... 50 mg  
 Excipientes..... C.S.

Vía de administración: Oral.

**Información General:** es un anti adrenérgico agente-beta bloqueador adrenérgico.

**Farmacocinética:** después de la administración oral es completamente absorbido, excretado en gran parte en la orina como fármaco invariable.

Duración de acción: >24 horas

**Indicaciones:** Hipertensión, angina de pecho, infarto agudo de miocardio.

**Dosis Y Administración:** Adultos: inicial: 50 mg una vez al día usado solo o agregado a un diurético. Incremente a 100 mg diariamente. La dosis superior a los 100 mg no añade beneficios.

Angina: inicialmente 50 mg diariamente. Si no hay respuesta, incremente a 100 mg después de una semana, máximo: 200 mg diariamente.

Niños: 1.0-1.3mg/kg/24 horas. Una diaria o dividida a cada 12 horas.

**Contraindicaciones:** Bloqueo cardiaco, choque carcinogénico, fallo cardiaco, bradicardia sinusal, historial de hipersensibilidad al atenolol.

**Efectos Adversos:** Bradicardia, náusea, vómitos, molestia epigástrica, mareos, fatiga, cansancio, erosión de la piel, dolor de pierna, enfriamiento de las extremidades debido a la insuficiencia arterial periférica.

**Precauciones Especiales:** Diabetes, disfunción renal, fallo cardiaco (no tratado) el retiro abrupto pudiera causar agina pectoral y precipitar infarto al miocardio.

**Interacciones:** Alcohol, anestésicos, antidepresivos, hipnóticos, cimetidina.

Diuréticos: efecto hipotensor mejorado.

Analgésicos: NSAIDs antagoniza el efector hipotensor.

Antibacterianos (rifampicina) reduce la concentración plasma de atenolol.

Antidiabéticos: efecto hipoglucémico mejorado

Antihipertensivos: efecto hipotensivo mejorado, con clonidina hay un incremento de la gravedad de la hipertensión de rebote.

Bloqueadores de los canales de calcio: riesgo mayor de bradicardia y bloqueo AV con diltiazem, hipotensión severa y fallo cardiaco con verapamil, nifedipina.

Glucósidos cardiacos: bloquea AV incrementado y bradicardia.

Colinérgicos: efectos antagonizados por el atenolol.

Corticosteroideos: antagonismo de efectos hipotensivo

Ergotamina: vasoconstricción periférica incrementada.

Simpaticomiméticos: hipertensión severa con adrenalina y noradrenalina.

Exámenes de laboratorios: interfiere con las pruebas de tolerancia de glucosa o insulina.

**Conservación :** Consérvese en un lugar fresco y seco, no mayor de 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Presentación:** Blíster de 10 tabletas y 10 tabletas empacadas en una caja impresa.

**Sobre Dosis Y Tratamiento**

Los síntomas predominantes reportados siguientes a la sobre dosis de atenolol son letargo, trastorno del impulso respiratorio, sibilancias, pausa sinusal y bradicardia. Adicionalmente, efectos comunes relacionados con la sobre dosis de cualquier agente de bloqueo beta-adrenérgico y el cual podría ser esperado también en una sobre dosis de atenolol son insuficiencia cardiaca congestiva, hipotensión, bronco espasmos y/o hipoglucemia.

El tratamiento de sobre dosis debe estar dirigido a remover cualquier fármaco no absorbido por emesis inducida, lavado gástrico, o la administración de carbón activado. El atenolol puede ser removido de la circulación general por hemodiálisis. Otras modalidades de tratamiento deben ser empleadas a discreción del doctor y pueden incluir:

Fabricado por :

KWALITY PHARMACEUTICALS LTD.

Nag Kalan, Majitha Road, Amritsar- India

**CLINIMED**

Distribuido por :

CLINIMED, S.R.L.

Av. Monumental No.14,

Alameda, Santo Domingo